Neslia paniculata – řepinka latnatá

Původní areál této jednoleté rostliny se rozkládal pravděpodobně pouze v jihozápadní Asii. Dnes však roste v celé Evropě kromě nejsevernějších částí jako plevel v polích a na různých ruderálních biotopech (Dvořáková 1992). Vzhledem k tomu, že jí vyhovují teplé a mírně teplé oblasti, je na Šumavě vzácná. Doposud byla zaznamenána pouze na české a rakouské straně pohoří a pouze v nejníže položených a okrajových oblastech. V Českokrumlovském Předšumaví byla nalezena v Květušíně, ve Chvalšinském Předšumaví v býv. osadě Lomek, v Kaplickém mezihoří u Milné (Holub et Skalický 1961), ve Svatotomášské hornatině u Spáleniště (kolektiv ČSBS in Kolektiv 1995–1997), v Hornovltavské kotlině na narušeném místě podél nově vybudované cyklistické stezky mezi Hůrkou a Černou v Pošumaví v roce 2020, v Horním Pootaví v ječném poli u Kašperských Hor v roce 1997 a v Královském Hvozdu na úhoru u Střední Svinné v roce 1996 (Pladias 2021). Na rakouské straně byl druh zaznamenán v okolí Sankt Oswald bei Haslach (Kraml et Lindbichler 1996).

Neslia paniculata – Rispen-Finkensame, Finkensame

Původní areál této jednoleté rostliny se rozkládal pravděpodobně pouze v jihozápadní Asii. Dnes však roste v celé Evropě kromě nejsevernějších částí jako plevel v polích a na různých ruderálních biotopech (Dvořáková 1992). Vzhledem k tomu, že jí vyhovují teplé a mírně teplé oblasti, je na Šumavě vzácná. Doposud byla zaznamenána pouze na české a rakouské straně pohoří a pouze v nejníže položených a okrajových oblastech. V Českokrumlovském Předšumaví byla nalezena v Květušíně, ve Chvalšinském Předšumaví v býv. osadě Lomek, v Kaplickém mezihoří u Milné (Holub et Skalický 1961), ve Svatotomášské hornatině u Spáleniště (kolektiv ČSBS in Kolektiv 1995–1997), v Hornovltavské kotlině na narušeném místě podél nově vybudované cyklistické stezky mezi Hůrkou a Černou v Pošumaví v roce 2020, v Horním Pootaví v ječném poli u Kašperských Hor v roce 1997 a v Královském Hvozdu na úhoru u Střední Svinné v roce 1996 (Pladias 2021). Na rakouské straně byl druh zaznamenán v okolí Sankt Oswald bei Haslach (Kraml et Lindbichler 1996).


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY