Populus ×canadensis – topol kanadský

Hybridogenní taxon vzniklý umělým křížením evropského topolu černého (Populus nigra) a severoamerického topolu bavlníkového (P. deltoides), který se v teplejších oblastech střední Evropy chová jako invazní dřevina. Na Šumavě je vzácně pěstován v lesích i mimo les, např. u Bad Kötzting (Meierott L. et al. in GBIF 2020), Hamerského Dvora (Matějková et al. 1996), Borových Lad (Košťálová V. a Ekrt L. in PLADIAS 2020) a Neureichenau (Zahlheimer W. in GBIF 2020).

Populus ×canadensis – Kanada-Pappel, Kanadische Pappel, Bastard-Schwarz-Pappel

Ein hybridogenes Taxon, das durch die künstliche Kreuzung der europäischen Schwarz-Pappel (Populus nigra) und der nordamerikanischen Kanadischen Schwarz-Pappel (P. deltoides) entstand, welches sich in wärmeren Teilen Mitteleuropas als invasives Gehölz verhält. Im Böhmerwald wird sie selten in Wäldern sowie außerhalb Wälder gepflanzt, z. B. bei Bad Kötzting (Meierott L. et al. in GBIF 2020), Hamerský Dvůr (Matějková et al. 1996), Borová Lada (Košťálová V. a Ekrt L. in PLADIAS 2020) und Neureichenau (Zahlheimer W. in GBIF 2020).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NE (Not Evaluated/Nehodnocené/Nicht beurteilt)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY