Alchemilla glabra – kontryhel lysý

Kontryhel lysý se vyskytuje souvisle v severní a střední Evropě, ostrůvkovitě v horách jižní a západní Evropy. Na Šumavě patří mezi nejběžnější kontryhele a je nejčastějším zástupcem tzv. lysých kontryhelů (ser. *Subglabrae* Pawl), roste roztroušeně na celém území od nejnižších do nejvyšších poloh. Nejčastěji osidluje vlhké louky, břehy vodních toků, prameniště a vlhké příkopy cest v lesích i mimo les.

Nejvyšší výskyt: 1410 m n. m.

Alchemilla glabra – Kahler Frauenmantel

Der Kahle Frauenmantel kommt in einem zusammenhängenden Areal in Nord- und Mitteleuropa sowie inselartig in den Bergen Süd- und Westeuropas vor. Im Böhmerwald gehört er zu den am weitesten verbreiteten Frauenmänteln und ist der häufigste Vertreter der sog. kahlen Frauenmäntel (ser. *Subglabrae* Pawl), er wächst zerstreut im gesamten Gebiet von den niedrigsten bis zu den höchsten Lagen. Er besiedelt vorwiegend feuchte Wiesen, Ufer von Wasserläufen, Quellfluren und sowohl beschattete als auch besonnte feuchte Straßengräben.

Nejvyšší výskyt: 1410 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).


Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Alchemilla glabra* – Alena Lepší – Kašperské Hory.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Alchemilla glabra* – Alena Lepší – Kašperské Hory.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY