

Luční prameniště




Luční studánky bývají nenápadné. Na Šumavě se nejčastěji setkáme s prameništi s vyvěrající vodou chudou na rozpuštěné minerály a s malým množstvím živin. Proto i vegetace je zde nízká a často dominují mechorosty. Bylinné patro bývá chudé a tvořené porosty s převahou nízkých bylin. Luční prameniště jsou mozaikovitě vtroušená do jiných lučních biotopů. Jde o ohrožená stanoviště zejména kvůli nevhodnému způsobu hospodaření a eutrofizaci. Ačkoliv prameniště bývají druhově chudá, jsou velice významná, neboť se jedná o tradiční, dnes zanikající prvek naší krajiny, který je mimo jiné zásadní pro udržení tolik potřebné vody v krajině.



Aby naši předkové mohli v minulosti na podmáčených loukách vůbec hospodařit, byla voda odváděna mělkými kanálky, které zarůstaly prameništní vegetací. Bez údržby mělkých stružek a pravidelného kosení nebo pastvy je tento typ vegetace rychle nahrazen běžnou mokřadní vegetací.

Damit unsere Vorfahren auf versumpften Wiesen überhaupt wirtschaften konnten, wurde das Wasser mit kleinen seichten Kanälen abgeleitet, die mit der Quellvegetation bewachsen. Ohne Instandhaltung von seichten Rinnen und regelmäßiges Mähen oder Weiden wird dieser Vegetationstyp durch die gewöhnliche Sumpfvvegetation schnell ersetzt.



Typickým průvodcem otevřených osluněných prameništ s vyvěrající vodou je dnes velice vzácná zdrojovka hladkosemenná (*Montia fontana*). Doprovází ji další druhy jako vrbovka tmavá (*Epilobium obscurum*), ptačinec mokřadní (*Stellaria alsine*), různé mechy, jako třeba vlahovka prameništní (*Philonotis fontana*) nebo velmi vzácně rozchodník huňatý (*Sedum villosum*). Naopak běžným druhem prameništ je blatouch bahenní (*Caltha palustris*).

Der typische Begleiter von offenen besonnten Quellgebieten mit quellendem Wasser ist heute das sehr seltene Bach-Quellkraut (*Montia fontana*). Es wird von weiteren Arten begleitet, wie dem Dunkelgrünen Weidenröschen (*Epilobium obscurum*), der Bach-Sternmiere (*Stellaria alsine*), verschiedenen Moosen, z. B. dem Gemeinen Quellmoos (*Philonotis fontana*) oder sehr selten mit der Sumpf-Fetthenne (*Sedum villosum*). Eine im Gegenteil gewöhnliche Art der Quellgebiete ist die Sumpf-Dotterblume (*Caltha palustris*).

Celá řada druhů prameništ byla kdysi rozšířena i v nižších polohách, kde však zpravidla vyhynuly. Symbolem takových druhů může být krásný všivec bahenní (*Pedicularis palustris*), který dnes patří ke kriticky ohroženým druhům. Podobně atraktivní je starček potoční (*Tephrosieris crispa*), který je jedním ze symbolů šumavských prameništ.



Eine ganze Reihe von Quellgebieten war einst auch in niedrigeren Lagen verbreitet, wo sie jedoch in der Regel untergingen. Ein Symbol dieser Arten kann das wunderschöne Sumpf-Läusekraut (*Pedicularis palustris*) sein, das in der Gegenwart zu den kritisch gefährdeten Arten gehört. Ähnlich attraktiv ist das Krause Greiskraut (*Tephrosieris crispa*), das eines der Symbole der Böhmerwälder Quellgebiete darstellt.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



Přírodovědecká
fakulta
Faculty
of Science

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



SNSB

Staatliche
Naturwissenschaftliche
Sammlungen Bayerns

NATIONALPARK
Bayerischer Wald

